

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

DLP 30-6-64 313691

PUBLICATION PÉRIODIQUE

**ÉDITION DE LA STATION D'ORLÉANS** (Tél. 87-45-41)

(CHER, INDRE, LOIRET, LOIR-ET-CHER, NIÈVRE, YONNE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 21, rue Eugène-Vignat - ORLÉANS.  
C. C. P. : ORLÉANS 4.604-25

**ABONNEMENT ANNUEL**

**15 Francs**

Supplément n° 4 au Bulletin n° 45 de Juin 1964

29 JUIN 1964

- 22 -

AVERTISSEMENTS

VIGNE

## MILDIOU DE LA VIGNE

Les pluies du 13 au 15 Juin et dans certaines régions celles du 18 Juin ont provoqué des contaminations qui se sont manifestées par des apparitions de taches durant la semaine écoulée.

Les pluies orageuses de ces derniers jours ont donc assuré le "repiquage" de la maladie. De nouvelles sorties de taches sont à prévoir en fin de semaine. Des pluies survenant à partir du 3 Juillet pourraient provoquer une extension dangereuse du Mildiou. Les jeunes raisins sont actuellement très sensibles aux contaminations.

En conséquence, il est conseillé d'effectuer un nouveau traitement qui devra être terminé avant le 3 Juillet.

## BLACK-ROT DE LA VIGNE

Les manifestations de la maladie sont maintenant très nombreuses sur les feuilles dans toutes les vignes contaminées et non traitées conformément aux indications données dans nos précédents Bulletins. Des attaques sur grappes sont maintenant à craindre à partir des taches qui existent sur les feuilles.

Le traitement dirigé contre le Mildiou sera également efficace contre le Black-Rot.

L'application des traitements conseillés contre le Black-Rot est obligatoire dans toutes les zones contaminées.

## ARBRES FRUITIERS

### CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Le relèvement des températures observé depuis quelques jours a favorisé l'activité des derniers papillons de la première génération. De nouvelles pontes ont été déposées.

En conséquence, il est conseillé d'effectuer un nouveau traitement qui devra être exécuté à la fin de la semaine.

### TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

Il est conseillé de profiter du traitement dirigé contre le Carpocapse pour ajouter un fongicide en tenant compte des possibilités de mélange.

P./45

INFORMATIONSVIGNEOIDIUM DE LA VIGNE

Il est conseillé d'ajouter un produit anti-oidium à la bouillie destinée à combattre le Mildiou de la vigne.

ARBRES FRUITIERSANTHRACNOSE DU CERISIER

Nous rappelons les termes de notre Bulletin du 11 Juin. Afin d'éviter une extension dangereuse de la maladie si une période pluvieuse survenait, il est recommandé d'effectuer un traitement sur toutes les variétés sensibles immédiatement après la cueillette des cerises.

PUCERONS - PSYLLES - ARAIGNEES ROUGES

L'activité de ces divers ravageurs est quelquefois importante dans certains vergers.

Il est donc nécessaire d'être très attentif afin d'intervenir, le cas échéant, en utilisant un des produits mentionnés dans la liste qui a été remise à chaque abonné.

CULTURES LEGUMIERESSEPTORIOSE DU CELERI

Les premières manifestations de la maladie ont été observées dans quelques cultures.

Il est donc prudent d'effectuer un premier traitement en suivant les indications données dans notre Bulletin Technique n° 45.

TEIGNE DU POIREAU

De nouvelles pontes ont été déposées depuis quelques jours et des éclosions auront lieu dans le courant de la semaine.

En conséquence, il est conseillé d'effectuer un traitement dès réception de ce Bulletin en utilisant un produit à base de Parathion ou d'Azinphos.

ERRATUM

Dans notre Bulletin Technique du 2 Juin nous avons conseillé contre les Noctuelles ou Vers Gris les produits à base de TOXAPHENE à la dose de 4.500 g de matière active pour 100 kgs de son.

Il s'agit d'une erreur. La dose homologuée est de 600 g de TOXAPHENE pour 100 kgs de son.

Les Contrôleurs chargés des Avertissements  
Agricoles,  
G. RIBAUT.  
B. PACQUETEAU.

L'Inspecteur de la Protection  
des Végétaux,  
G. BENAS.